



EFFECTOS DE APLICACIÓN DE AVG ReTain®

Ensayos temporada 2018-19, momento de aplicación: 40% flor


Efecto de aplicación de AVG (**ReTain®**) sobre la cantidad de frutos retenidos durante dos momentos de pos-floración (caída de chaqueta y post caída natural de frutos) de cerezos 'Kordia'. Angol, Región de la Araucanía.



Efecto de aplicación de AVG (**ReTain®**) sobre la cantidad de frutos retenidos durante dos momentos de pos-floración (caída de chaqueta y post caída natural de frutos) de cerezos 'Regina'. Angol, Región de la Araucanía.



Efecto de aplicación de AVG (**ReTain®**) sobre el rendimiento por árbol en cerezos 'Regina' y 'Kordia'. Angol, Región de la Araucanía.



ReTain®

Plant Growth Regulator

MULTIPLICA TU NEGOCIO

SU ACCIÓN ÚNICA COMO INHIBIDOR DE ETILENO EXTIENDE EL PERIODO EFECTIVO DE POLINIZACIÓN, (PEP) AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA CUAJA.

MOMENTO APLICACIÓN: 30-50% FLOR.



SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.
 ® Marca Registrada de Sumitomo Chemical Co Ltd.
 Avda. Kennedy 5735, Of. 1601 B Torre Poniente Las Condes
 Santiago - Chile Teléfono: (56-2) 2835 0500
 www.sumitomochemicalchile.com



SUMITOMO CHEMICAL CHILE

ReTain® AUMENTA LA CUAJA EN CEREZOS

ReTain®, inhibe específicamente la síntesis de etileno extendiendo la viabilidad de las flores, aumentando así la oportunidad de que haya una mayor cuaja.

ReTain®, aplicado en malas condiciones naturales para la polinización (como frío, viento, baja actividad de abejas, humedad) o en variedades de poca cuaja, asegura un aumento en la productividad de tu huerto.

- EXTIENDE EL PERIODO EFECTIVO DE POLINIZACIÓN (PEP)
- AUMENTA EL POTENCIAL DE CUAJA Y RETENCIÓN DE FRUTA EN CONDICIONES DE BAJA ACTIVIDAD DE ABEJAS.
- INCREMENTA EL POTENCIAL DE FRUCTIFICACIÓN Y RENDIMIENTO.

MAXIMICE EL POTENCIAL

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE

LUGAR	VARIEDAD	CUAJA	PESO FRUTO	PRODUCCIÓN
Puente Negro	Regina/Cab 6P			+
Morza	Regina/Gisella 6	+		+
Morza	Regina /Colt		-	++
Puente Negro	Staccato/Colt	+		++
Linares	Staccato/Colt			++
Chimbarongo	Staccato/Colt			+
Morza	Kordia/Maxma 14	=	=	++
Morza	Kordia/Colt		+	++
Puente Negro	Kordia/Calb 6P		+	+
San Vicente	Bing/Santa Lucía	=	=	=
La Compañía	Bing/Colt	-	=	=



La aplicación de **ReTain®** en floración produce aumentos significativos en la cantidad de frutos cuajados.



ReTain®
maximiza
el potencial
de cuaja.

CÓMO SE USA

Dosis:

1 bolsa / ha (830 g/ha)

Equipo:

Pulverizador

Volumen:

1000 L agua / ha.

Aplicación:

Sin surfactante

Momento de Aplicación:

Entre un 30 y 50% de flores abiertas.



IMPORTANTE

- Tiempo de reingreso: 12 horas
- No aplicar **ReTain®** si se esperan lluvias dentro de las 8 horas después de la aplicación

RETAIN® NO AFECTA LA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS.

