Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente.
Lea atentamente la etiqueta.

SUMITOMO CHEMICAL

Tazer® Xpert combina 2 modos de acción potenciando el efecto de Azoxistrobina con Epoxiconazole, el triazol de mayor performance del mercado. Esta combinación brinda el **mejor efecto preventivo, curativo y erradicante** contra royas y manchas en trigo.

AZOXISTROBINA

- Acción sistémica con rápida acción.
- Actúa sobre el proceso respiratorio del patógeno.
- Inhibe la germinación de esporas.
- Detiene el desarrollo inicial del hongo.
- Actividad translaminar y alta persistencia.

EPOXICONAZOLE

- Acción sistémica con alta persistencia.
- Traslocación acrópeta (desde la base al ápice).
- Detiene el crecimiento del micelio y evita la esporulación.

Control de enfermedades con TazerXpert

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE CONTROLA

Roya anaranjada *(Puccinia triticina)*, Roya amarilla o lineal del trigo *(Puccinia striiformis)*, Roya negra *(Puccinia graminis)*, Mancha amarilla *(Dreschlera tritici repentis)*, Septoriosis *(Septoria tritici)*.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (CM³/HA)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo	Roya anaranjada *(Puccinia recondita)* Roya amarilla o lineal del trigo *(Puccinia striiformis)* Roya negra *(Puccinia graminis)* Mancha amarilla *(Dreschlera tritici repentis)* Septoriosis *(Septoria tritici)*	300 - 400 +1 % v/v aceite metilado de soja	Aplicar en hoja bandera (Zadoks 3.9), al aparecer los primeros síntomas
Cebada	Mancha en red *(Pyrenophora teres / Drechslera teres)* Roya de la cebada *(Puccinia hordei)* Mancha borrosa de la cebada *(Bipolaris sorokiniana)*	300 - 400 +1 % v/v aceite metilado de soja	Realizar las aplicaciones a partir de encañazón, con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En años con alta presión de la enfermedad y condiciones favorables para su desarrollo, realizar aplicaciones cada 3 – 4 semanas.

Momentos de la aplicación:



Características técnicas y principales beneficios:

CONCENTRACIÓN
Azoxistrobina 25% + Epoxiconazole 12,5%

FORMULACIÓN
Suspensión concentrada (SC)

USO
Fungicida sistémico de aplicación foliar

TARGET
Manchas y royas

MODO DE ACCIÓN
Inhibición del complejo III de la respiración (Grupo 11) e inhibición de biosíntesis del ergosterol (Grupo 3)

CULTIVOS
Soja, Trigo, Maíz, Cebada, Maní

DOSIS RECOMENDADA
Ver etiqueta

PRESENTACIÓN
4x5 Lts.

BANDA TOXICOLÓGICA
Azul (Categoría III)

BENEFICIOS:
El triazol con mayor eficacia del mercado. Alta concentración de Azoxistrobina. Acción preventiva, curativa y antiesporulante. Combina dos modos de acción retrasando la aparición de resistencia. Amplio espectro de control.